

D₃ VitaCaps

CHOLECALCIFEROL 24'000 IE / Kapsel

Wie 1-mal tanken und 1 Monat* Gas geben



- mit Einnahme-Raster -

✓ Einfache Einnahme

Prophylaktisch: nur 1 x im Monat*
Therapeutisch: nur 1 x pro Woche*

✓ Einfache Darreichung als kleine Weichkapsel

✓ Für Vegetarier geeignet.
Und cassenzulässig**

(Originalgrösse)



Introducing the new **IntelliSense** feature in Visual Studio 2010.



LABORATOIRE

LABORATOIRES
Pierre Fabre
Pharmaceutical Care

Dosierung von D3 VitaCaps®:

1 Kapsel (24'000 IE) ...

		Prophylaxe	Risiko wegen Malabsorption	> 60 Jahre
		bei Erwachsenen	... wöchentlich	... monatlich
Vitamin D-Mangel	Anfänglich ... wöchentlich ...	Erweitert	Erhaltend	
			≤ 60 Jahre	> 60 Jahre
leicht (25–50 nmol/L)	... über 2 bis 4 Wochen (oder 2 bis 4 Kapseln als Einzeldosis)	... alle 2 Wochen	... ca. alle 6 Wochen (entspr. 600 IE pro Tag)	... monatlich (entspr. 800 IE pro Tag)
schwer (< 25 nmol/L)	... über 6 Wochen (oder 6 Kapseln als Einzeldosis)	-		
bei Jugendlichen (12–18 Jahre)	... über 2 Wochen (oder 2 Kapseln als Einzeldosis)	... wöchentlich		

Erweiterte Therapie = bei nicht ausreichendem Anstieg des Vitamin D-Spiegels. Bei Jugendlichen: Eine kumulierte Gesamtdosis von 96'000 IE sollte nur unter engmaschiger Überwachung der 25-Hydroxyvitamin D-Konzentrationen überschritten werden.
Vollständige Informationen entnehmen Sie bitte der Fachinformation unter www.swissmedicinfo.ch.

kassenzulässig**

D3 VitaCaps®
24'000 IE Cholecalciferol
pro Kapsel:

6 Weichkapseln	Art.Nr. PF	PHC	Fabrikabgabepreis (exkl. MwSt.)	Publikumspreis (inkl. MwSt.)
	P3000677 X00580	1001784	7.65 CHF	17.55 CHF

* Eine Kapsel deckt die vom BAG empfohlene tägliche Vitamin D-Zufuhr für über 60-Jährige für einen Monat ab, <https://www.blv.admin.ch/blv/de/home/das-blv/organisation/kommissionen/ekk/vitamin-d-mangel.html>, letzter Zugriff: 04/2025. Und siehe Dosierung in der untenstehenden KFI oder in der Fachinformation.

** Zur Therapie bei nachgewiesenem schwerem Vitamin D-Mangel (Serumkonzentration von 25-Hydroxycholecalciferol < 25 nmol/l bzw. < 10 ng/ml) bei Erwachsenen und Jugendlichen ab 12 Jahren.

Referenzen zu wissenschaftlichen Studien können beim Unternehmen angefordert werden.

Kurzfachinformation D3 VitaCaps® Weichkapseln

Z: Cholecalciferol (Vitamin D3). I: Vitamin D-Mangel Therapie bei Erwachsenen und Jugendlichen ≥ 12 Jahre, Vitamin D-Mangel Prophylaxe bei Erwachsenen > 60 Jahre oder mit Risiko einer Vitamin D-Mangelerkrankung bei Malabsorption. D: Initialbehandlung: Vitamin D-Mangel bei Erwachsenen: In Abhängigkeit vom Schweregrad des Vitamin D-Mangels 2–6 Weichkapseln als Einzeldosis. Alternativ über 2–6 Wochen 1 Kapsel pro Woche. Bei Bedarf Fortsetzung mit 1 Kapsel alle 2 Wochen. Vitamin D-Mangel bei Jugendlichen ≥ 12 J.: 2 Kapseln als Einzeldosis. Alternativ über 2 Wochen 1 Kapsel pro Woche. Bei Bedarf Fortsetzung mit 1 Kapsel pro Woche. Kumulative Gesamtdosis > 96'000 IE nur unter engmaschiger Überwachung der 25-OH-D-Konzentration. Erhaltungstherapie und Prophylaxe: Erwachsene > 60 J.: 1 Kapsel pro Monat. Erwachsene ≤ 60 J. und Jugendliche ≥ 12 J.: Einer Tagesdosis von 600 IE entsprechend. Erwachsene mit Risiko einer Vitamin D-Mangelerkrankung bei Malabsorption: 1 Kapsel pro Woche. KI: Hypercalcämie, Hypercalciurie, Neigung zur Bildung calciumhaltiger Nierensteine, schwere Niereninsuffizienz, Pseudohypoparathyreoidismus, Hypervitaminose D, Überempfindlichkeit gegenüber Wirkstoff oder Inhaltsstoffen. VM: Bei Langzeitbehandlung Calcium in Serum und Urin sowie Nierenfunktion überwachen und auf Symptome möglicher Überdosierung hinweisen. Vorsicht bei Störungen der renalen Calcium- und Phosphatausscheidung, des Calciumstoffwechsels, Hyperphosphatämie, Arteriosklerose, koronarer Herzerkrankung, eingeschränkter Nierenfunktion, Nephrolithiasis, Sarkoidose, immobilisierten Patienten, sowie gleichzeitiger Behandlung mit Benzothiadiazin-Derivaten, Herzglykosiden, Calcium (ärztlich überwacht). Keine anderen Vitamin D Quellen einnehmen. SS: Einnahme während der Schwangerschaft/Stillzeit nicht empfohlen. IA: Ionenaustauscherharze, paraffinhaltige Laxantien, Leberenzyminduktoren, Zytotoxine, Herzglykoside, Thiazid-Diuretika, Glukokortikoide. UAW: I.d.R. Symptome einer Überdosierung. Seltener: Überempfindlichkeitsreaktionen. Liste B, SL. Ausführliche Informationen unter www.swissmedicinfo.ch. Pierre Fabre Pharma AG, 4052 Basel. 02/2022

www.vitaminDmangel-hilfe.ch



LABORATOIRES

Pierre Fabre
Pharmaceutical Care

CH-D3v-04-25-2500001, P3000676